

Calendrier de culture 2022-2023



RHÔNE ALPES







La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

HR: Haute Résistance - BI: Bremia lactucae; Nr: 0: Nasonovia ribisnigri biotype 0; Fol: Fusarium oxysporum f. sp lactucae

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

VILMORIN-MIKADO

Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE T. 02 41 79 41 51 Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS vilmorinmikado.fr Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :

Depts. 01, 03, 07, 26, 38, 42, 63, 69, 73, 74: Olivier BEL - 06 70 21 95 37




^{*} Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



Calendrier de culture 2022-2023



LAITUES D'ABRI RHONE ALPES



Plantation

Récolt

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol

HR: Haute Résistance; IR: Résistance Intermédiaire - Bl: Bremia lactucae; Nr: 0: Nasonovia ribisnigri biotype 0; Fol: Fusarium oxysporum f. sp lactucae

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

VILMORIN-MIKADO

Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE T. 02 41 79 41 51 Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS vilmorinmikado.fr Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :

Depts. 01, 03, 07, 26, 38, 42, 63, 69, 73, 74 : **Olivier BEL - 06 70 21 95 37**



^{*} Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01